

Sóc la Neus, la mare d'un nen víctima d'una meningitis bacteriana. Aquesta fou causada per la bacteria Streptococc Pyogenes y no va ser més que una complicació de la infecció de vies respiratòries que aquesta provoca.

Durant els vint dies de patiment en els que vam estar ingressats vam poder veure com la planta i la UCI s'anava omplint de nens amb malalties respiratòries. Al sortir de l'hospital i constatar en diverses ocasions que molts pares continuen portant els seus fills malalts a l'escola o llar d'infants vaig decidir que havia de fer alguna cosa per lluitar contra això.

*Pare i mare, portar al teu fill malalt a la llar d'infants el perjudica greument a ell i al seu benestar. És una forma de tractar-lo malament i per tant, una conducta reprovable.*

*Per altra banda, és una falta d'empatia cap a altres companys que potser tenen un sistema immunitari més immadur i una simple infecció de mocs i tos pot tenir conseqüències greus, com va ser el nostre cas.*

Hi ha un problema real de conciliació però hem de ser capaços de buscar alternatives, sense perjudicar l'ambient "segur" de la llar.

Ajuda'm a aconseguir un entorn més segur, lliure de virus i buidar els hospitals de bronquiolitis. Perquè no oblidis que sempre pot passar que el que acabi a la UCI, sigui el teu fill.

Per això us dono tota la informació sobre les malalties més freqüents i el període en el que són contagioses perquè la informació és imprescindible per actuar correctament.

1. Quan es truca als pares/mares perquè un nen té febra l'ha de venir a buscar.
2. En cap cas, s'ha de portar al dia següent amb la dosi de medicació suficient per emmascarar el procés.

#### **COSTIPAT COMÚ:**

PERÍODE DE CONTAGI: el període simptomàtic

#### **CONJUNTIVITIS:**

VÍRICA: fins remissió de la simptomatologia.

BACTERIANA: fins a 2 dies després d'inici del tractament antibiòtic.

#### **DIARREES:**

PERÍODE DE CONTAGI: tot el període simptomàtic

#### **ESCARLATINA:**

PERÍODE DE CONTAGI: contagia desde dos dies abans de l'exantema fins a 2 dies després d'iniciar el tractament antibiòtic i afebrils.

#### **FARINGITIS:**

PERÍODE DE CONTAGI: contagia fins a 1 dia després d'iniciar el tractament

PERÍODE REINGRÉS: afebrils i asintomàtic

#### **IMPETIGEN:**

PERÍODE DE CONTAGI: contagia fins a 2 dies després d'iniciar el tractament.

#### **INFECCIÓ RESPIRATORIA BAIXA (PNEUMONIA, BRONQUITIS)**

PERÍODE DE CONTAGI: contagia durant tot el període simptomàtic.

#### **VIRUS BOCA, MÀ, PEU:**

PERÍODE DE CONTAGI: contagia durant tota 1 setmana.

*Que el proper*

NO SIGUI EL TEU FILL