

Soy Neus, madre de un niño víctima de una meningitis bacteriana. Esta fue causada por la bacteria Streptococco pyogenes y no fue más que una complicación de la infección de vías respiratorias que ésta provoca.

Durante los veinte días de sufrimiento en los que estuvimos ingresados pudimos ver cómo la planta y la UCI se iba llenando de niños con enfermedades respiratorias. Al salir del hospital y constatar en varias ocasiones que muchos padres siguen llevando a sus hijos enfermos a la escuela o guardería decidí que tenía que hacer algo para luchar contra ello.

Padre y madre, llevar a tu hijo enfermo a la guardería le perjudica gravemente a él y a su bienestar. Es una forma de tratarlo mal y por lo tanto, una conducta reprobable.

Por otra parte, es una falta de empatía hacia otros compañeros que quizás tienen un sistema inmunitario más inmaduro y una simple infección de mocos y tos puede tener consecuencias graves, como fue nuestro caso.

Hay un problema real de conciliación pero debemos ser capaces de buscar alternativas, sin perjudicar el ambiente "seguro" de la guardería o escuela. Ayúdame a conseguir un entorno más seguro, libre de virus y vaciar los hospitales de bronquiolitis. Por que no olvides que siempre puede pasar que el que acabe en la UCI, sea tu hijo.

Por eso os doy toda la información sobre las enfermedades más frecuentes y el período en el que son contagiosas porque la información es imprescindible para actuar correctamente.

1. Cuando se llama a los padres / madres por que un niño tiene fiebre debe venir a buscarlo.

2. En ningún caso, se llevará al día siguiente con la dosis de medicación suficiente para enmascarar el proceso.

RESFRIADO COMÚN:

PERIODO DE CONTAGIO: el periodo sintomático

CONJUNTIVITIS:

VÍRICA: hasta remisión de la sintomatología.

BACTERIANA: hasta 2 días después de inicio del tratamiento antibiótico.

DIARREAS:

PERIODO DE CONTAGIO: todo el periodo sintomático

ESCARLATINA:

PERIODO DE CONTAGIO: contagia desde dos días antes del exantema hasta 2 días después de iniciar el tratamiento antibiótico y afebriles.

FARINGITIS:

PERIODO DE CONTAGIO: contagia hasta 1 día después de iniciar el tratamiento

PERIODO REINGRESO: afebriles y asintomático

IMPÉTIGO:

PERÍODE DE CONTAGIO: contagia hasta 2 días después de iniciar el tratamiento.

INFECCIÓN RESPIRATORIA BAJA (NEUMONÍA, BRONQUITIS)

PERIODO DE CONTAGIO: contagia durante todo el periodo sintomático.

VIRUS BOCA, MANO, PIE:

PERIODO DE CONTAGIO: contagia durante toda 1 semana.

*Que el próxima*

NO SEA TU HIJO